

# Información Esencial del Cáncer Cervical



El cáncer cervical tiene varias etapas de pre-cáncer. Entre más avanzado este el cáncer a la hora de comenzar el tratamiento, más sube la probabilidad de muerte.

- Si el cáncer se encuentra cuando solo está localizado en el área del cervix, la probabilidad de supervivencia es ~96%
- Cuando el cáncer ya es regional (se extendió a otras áreas pélvicas), la probabilidad de supervivencia es ~56%
- Metástasis: Cuando el cáncer ya es distante (se extendió a otras partes del cuerpo fuera del área pélvica), la probabilidad de supervivencia es 17%


Qué significa esto?

## LA DETECCIÓN TEMPRANA ES MUY IMPORTANTE

### Causas del Cáncer Cervical

La causa del 99% de los casos de cáncer cervical es una infección previa con el VPH (virus del papiloma humano)

- El VPH es una infección de transmisión sexual
- El VPH es muy común; más de 40 millones de personas en los Estados Unidos viven con una infección del VPH y el ~80% de personas tendrán una infección del VPH al menos una vez en su vida
- Hay muchos mitos sobre el VPH y sobre su transmisión. Visite [www.latinascontracancer.org/health-education](http://www.latinascontracancer.org/health-education) para aprender más sobre el VPH




## Prevenición y Detección

La mejor forma de prevenir el cáncer cervical es prevenir una infección del VPH. La mejor forma de prevenir el VPH es con la vacuna del VPH. La vacuna se puede poner entre los 9 y 26 años de edad. Para más información sobre la vacuna, visite nuestra página web [www.latinascontracancer.org/health-education](http://www.latinascontracancer.org/health-education). Si necesita ayuda haciendo una cita para la vacuna, contacte nuestra oficina.



La mejor forma de detectar células anormales en el cervix en las etapas de pre-cáncer o cuando ya son cancerosas es con el examen de **Papanicolaou**. El examen toma una muestra de las células del cuello uterino para analizarlas.




© MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED.

Entre los 21 y 65 años, las mujeres deben hacerse un Papanicolaou **cada 3 años**, aunque estén vacunadas contra el VPH. También se recomienda que las mujeres se hagan un examen para detectar el VPH cada 5 años.


Las mujeres Latinas en los Estados Unidos tienen más casos y mueren más frecuentemente del cáncer cervical que las mujeres blancas.

### Que es el cancer cervical?

El cuello uterino (o el cervix) es la entrada de el útero. El cervix parece una dona, y normalmente es lisa y rosada. El cáncer cervical es cuando hay células cancerosas en el cervix que aparecen como manchas blancas.



<https://www.healthline.com/health-news/uterus-transplants-raise-hopes-and-ethical-concerns>



<https://www.mountsinai.org/health-library/diseases-conditions/nabothian-cyst>

